

Milprazon[®] Plus

milbemicin oksim + prazikvantel

NOVO!

prirodni okus



**Premmium
okus i
zaštita.**



Srčani crv



Plućni crv



Očni crv



Crijevni paraziti

 **KRKA**



- Širokospektralni antihelmintik
- Za štence od 2 tjedna starosti i mačiće od 6 tjedana starosti
- Fleksibilan i jednostavan za primjenu
- Djeluje na najučestalije parazite i zoonoze
- Siguran za gravidne kuje i mačke

Naziv ustanove

2.5/25 mg doziranje za male pse i štence

TJELESNA TEŽINA	BROJ TABLETA
0.5 – 1 kg	½ tablete
> 1 – 5 kg	1 tableta
> 5 – 10 kg	2 tablete

4/10 mg doziranje za male mačke i mačiće


TJELESNA TEŽINA	BROJ TABLETA
0.5 – 1 kg	½ tablete
> 1 – 2 kg	1 tableta

12.5/125 mg doziranje za pse

TJELESNA TEŽINA	BROJ TABLETA
5 – 25 kg	1 tableta
> 25 – 50 kg	2 tablete
> 50 – 75 kg	3 tablete

16/40 mg doziranje za mačke

TJELESNA TEŽINA	BROJ TABLETA
2 – 4 kg	½ tablete
> 4 – 8 kg	1 tableta
> 8 – 12 kg	1½ tableta



NAZIV VMP: Milprazon Plus, 4 mg/10 mg, filmom obložena tableta za male mačke i mačiće najmanje tjelesne mase 0,5 kg, Milprazon Plus, 16 mg/40 mg, filmom obložena tableta za mačke najmanje tjelesne mase 2 kg, Milprazon Plus, 2,5 mg/25 mg, filmom obložena tableta za male pse i štenad najmanje tjelesne mase 0,5 kg, Milprazon Plus, 12,5 mg/125 mg filmom obložena tableta za pse najmanje tjelesne mase 5 kg. **SASTAV:** Jedna filmom obložena tableta sadržava: milbemicin oksim 4/2,5/12,5/16mg i prazikvantel 10/25/125/40 mg. **INDIKACIJA:** Liječenje mješovitih invazija u mačaka i pasa uzrokovanih nezrelim i odraslim trakavicama i oblicima. Ovaj VMP također se može primjeniti i za sprječavanje srčane dirofilarioze (*Dirofilaria immitis*), ako je istovremeno indicirano i liječenje invazije trakavicama. **DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:** Primjena kroz usta. Za male mačke i mačiće 0,5-1kg: 1/2tbl., > 1 - 2 kg: 1 tbl. Odrasle mačke: Najmanja propisana doza: 2 mg milbemicin oksima i 5 mg prazikvantela na kg t.m. daje se jedanput kroz usta. Psi (mali psi i štenad): Najmanja propisana doza: 0,5 mg milbemicin oksima i 5 mg prazikvantela na kg t.m. daje se jedanput kroz usta. **NUSPOJAVE:** U vrlo rijetkim slučajevima, posebice u mladih mačaka i pasa, nakon primjene kombinacije milbemicin oksima i prazikvantela primijećeni su opći simptomi (poput letargije), neurološki simptomi (poput ataksije i tremora mišića) i/ili želučano-crijevni simptomi (poput povraćanja i proljeva). U vrlo rijetkim slučajevima primijećene su reakcije preosjetljivosti nakon primjene VMP-a. **POSEBNA UPOZORENJA:** Preporučuje se istovremeno liječenje svih životinja u kućanstvu. Prilikom planiranja učinkovitog program dehelmintizacije treba uzeti u obzir lokalne epizootiološke podatke i rizik od izloženosti pasa i mačaka navedenim parazitima, te se preporučuje zatražiti savjet stručnjaka (npr. veterinara). Kada je prisutna invazija s *D. caninum*, treba uzeti u obzir istovremeno liječenje infestacija uzrokovanih s posrednicima u razvojnom ciklusu navedene trakavice, kao što su buhe i uši, kako bi se spriječila ponovna invazija. Rezistencija parazita na neku skupinu antihelmintika može se razviti nakon učestale i ponavljane primjene antihelmintika iz te skupine. **KONTRAINDIKACIJE:** Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati mačkama mlađim od 6 tjedana i/ili tjelesne mase manje od 0,5 kg i štenadi mlađoj od 2 tjedna i/ili ako im je tjelesna masa manja od 0,5 kg. VMP se ne smije primjenjivati mačkama tjelesne mase manje od 2 kg i psima tjelesne mase manje od 5 kg. VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili na bilo koju pomoćnu tvar. **INTERAKCIJE:** Nisu primijećene interakcije nakon primjene propisane doze makrocikličkog laktone selamektina tijekom liječenja s propisanom dozom kombinacije milbemicin oksima i prazikvantela. U nedostatku drugih ispitivanja, ovaj VMP treba oprezno primjenjivati istovremeno s drugim makrocikličkim laktone. Ispitivanja interakcije navedenih tvari također nisu provedena na rasplodnim životinjama. **CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:** Mačka (male mačke i mačići) i pas (mali psi i štenad). **KARENCIJA:** Nije primjenjivo. **NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET:** KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. **NAČIN IZDAVANJA:** Na veterinarski recept.



Milprazon[®] Plus

milbemicin oksim + prazikvantel



Upitnik

Pas Mačka

Koliko često koristite sredstva protiv glista i trakavica na svom ljubimcu?

Nikad 4x godišnje
 1x godišnje (uz cijepljenje protiv bjesnoće) Više od 4x godišnje
 Manje od 4 puta godišnje Svaki mjesec

Da li ste ikada predali na pregled stolicu vašeg ljubimca na parazite?

Da Ne

Koliko je star vaš ljubimac?

Manje od 6 mjeseci Više od 6 mjeseci

Preporuča se mjesečna dehelmintizacija do 6. mjeseca starosti, a zatim ovisno o procjeni rizika.

Za štence i mačiće do 2 mjeseca starosti vrijedi poseban protokol, dehelmintizacija mora biti i češća.

Potrebno je postaviti nekoliko pitanja o načinu života vašeg ljubimca. Na taj način možemo savjetovati o odgovarajućoj zaštiti.

Živi li vaš ljubimac u bliskom kontaktu s malom djecom, starijim osobama ili osobama s kroničnim bolestima?

Da Ne

Živi li vaš ljubimac na selu ili ga ikada vodite iz grada na selo?

Da Ne

Lovi plijen (miševе, ptice) ili se hrani neobičnim stvarima (izmet, blato, itd.)?

Da Ne

Jede sirovo meso?

Da Ne

- Ako ste na bilo koje pitanje odgovorili DA, vaš ljubimac spada u rizičnu skupinu s povećanim rizikom od infekcije parazitima. Potrebna je redovita mjesečna dehelmintizacija.
- Ako ste na sva pitanja odgovorili NE, preporučamo dehelmintizaciju najmanje 4 puta godišnje. Budući da je srčani crv raširen u Hrvatskoj i može biti vrlo opasan za vašeg ljubimca, u sezoni komaraca (od travnja do studenog) neophodna je redovita uporaba antiparazitika svaki mjesec.

Milprazon[®] Plus

milbemicin oksim + prazikvantel



Upitnik

Pas Mačka

Koliko često koristite sredstva protiv glista i trakavica na svom ljubimcu?

Nikad 4x godišnje
 1x godišnje (uz cijepljenje protiv bjesnoće) Više od 4x godišnje
 Manje od 4 puta godišnje Svaki mjesec

Da li ste ikada predali na pregled stolicu vašeg ljubimca na parazite?

Da Ne

Koliko je star vaš ljubimac?

Manje od 6 mjeseci Više od 6 mjeseci

Preporuča se mjesečna dehelmintizacija do 6. mjeseca starosti, a zatim ovisno o procjeni rizika.

Za štence i mačiće do 2 mjeseca starosti vrijedi poseban protokol, dehelmintizacija mora biti i češća.

Potrebno je postaviti nekoliko pitanja o načinu života vašeg ljubimca. Na taj način možemo savjetovati o odgovarajućoj zaštiti.

Živi li vaš ljubimac u bliskom kontaktu s malom djecom, starijim osobama ili osobama s kroničnim bolestima?

Da Ne

Živi li vaš ljubimac na selu ili ga ikada vodite iz grada na selo?

Da Ne

Lovi plijen (miševe, ptice) ili se hrani neobičnim stvarima (izmet, blato, itd.)?

Da Ne

Jede sirovo meso?

Da Ne

- Ako ste na bilo koje pitanje odgovorili DA, vaš ljubimac spada u rizičnu skupinu s povećanim rizikom od infekcije parazitima. Potrebna je redovita mjesečna dehelmintizacija.
- Ako ste na sva pitanja odgovorili NE, preporučamo dehelmintizaciju najmanje 4 puta godišnje. Budući da je srčani crv raširen u Hrvatskoj i može biti vrlo opasan za vašeg ljubimca, u sezoni komaraca (od travnja do studenog) neophodna je redovita uporaba antiparazitika svaki mjesec.