

9. Razdvojite dlaku između lopatica kako bi se vidjela koža.

10. Prislonite vrh pipete na kožu i aplicirajte nekoliko puta.

11. Kod velikih pasa pipetu rasporedite dužinom leđa na 3-4 mjesta.

12. Istisnite pipetu u potpunosti. Jednu pipetu primijeniti za samo jednog ljubimca.

13. Dlaku ljubimca ne dirajte dok se ne osuši.

14. Nemojte utrljavati rukama na mjestu primjene pipete.

15. Tretirajte sve ljubimce u svom domu.

16. Zapišite si datum aplikacije i ponovite za mjesec dana.

Jednostavna primjena Ataxxe!

- **Lako se otvara:** nisu potrebne škare
- **Lako se primjenjuje:** mekane stijenke pipete
- **Jednostavna za rukovanje:** pipeta se može zatvoriti ako vaš ljubimac ne surađuje



UVIJEK STE U POKRETU I ŽELITE DA VAŠ PAS OSTANE ZDRAV? ATAXXA JE SAVRŠENA ZA AKTIVNE PSE.



Naziv VMP: Ataxxa, otopina za nakapavanje 200 mg/40 mg za pse do 4 kg, 500 mg/100 mg za pse od 4 kg do 10 kg, 1250 mg/250 mg za pse od 10 do 25 kg i 2000 mg/400 mg za pse od 25 kg. **Sastav:** Djelatne tvari: Permetrin i Imidakloprid. **Indikacije:** Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje i sprječavanje infestacije buhama (*Ctenocephalides felis*). Buhe na psima ugibaju unutar jednog dana nakon primjene. Jedna primjena sprječava nove infestacije buhama tijekom četiri tjedna. VMP se može koristiti kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (engl. *flea allergy dermatitis* - FAD). VMP omogućuje neprekidnu akaricidnu učinkovitost protiv infestacija krpeljima (*Rhipicephalus sanguineus* i *Ixodes ricinus* tijekom četiri tjedna, a *Dermacentor reticulatus* tijekom tri tjedna) i neprekidnu repelentnu učinkovitost (*Ixodes ricinus*) u trajanju 3 tjedna. Postoji mogućnost da krpelji na psu ne uginu unutar dva dana nakon primjene VMP-a te mogu ostati pričvršćeni i vidljivi. U vrijeme primjene VMP-a preporučuje se uklanjanje nepričvršćenih krpelja na psu, kako bi ih se spriječilo u pričvršćivanju i hranjenju. Jedna primjena osigurava repelentni učinak (sprječava hranjenje) protiv infestacije papatačima *Phlebotomus perniciosus* tijekom 3 tjedna te protiv infestacije komarcima *Aedes aegypti* od 7 dana do 14 dana nakon primjene. **Doziranje i način primjene:** Najmanja preporučena doza je: 10 mg imidakloprida/kg tjelesne mase (t.m.) i 50 mg permetrina/kg t.m. Doziranje nakapavanjem na kožu treba biti u skladu s tjelesnom masom (vidjeti Uputu). **Nuspojave:** Vrlo rijetko, na mjestu primjene VMP-a mogu se pojaviti svrbež, gubitak dlake, crvenilo, otekline i erozije. Ove nuspojave obično spontano nestaju. **Posebna upozorenja:** Prilikom primjene VMP-a treba paziti da sadržaj pipete ne dođe u kontakt s očima ili ustima tretiranih pasa. Treba paziti da se VMP primijeni ispravno. **Kontraindikacije:** Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, VMP se ne smije primjenjivati štenu mladog od 7 tjedana ili laksoj od 1,5 kg. **Interakcije:** Nisu poznate. **Ciljne vrste životinja:** Pas. **Karencija:** Nije primjenjivo. **Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:** KRKA, d.d., Novo mesto, Smarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. **Način izdavanja:** VMP se ne izdaje na veterinarski recept.

Težina psa	≤4 kg	>4 kg ≤10 kg	>10 kg ≤25 kg	>25 kg ≤40 kg
Doziranje	0,4 ml pipeta	1,0 ml pipeta	2,5 ml pipeta	4,0 ml pipeta

Najmanja preporučena doza je: 10 mg imidakloprida/kg tjelesne mase (t.m.) i 50 mg permetrina/kg t.m.

Za pse >40 kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju pipeta.

REFERENCE:

- Wright I, Cull B, Gillingham EL et al. Be tick aware: when and where to check cats and dogs for ticks. *Vet record* 2018; 1-4.
- Furness RW, Furness EN. *Ixodes ricinus* parasitism of birds increases at higher winter temperatures. *J Vector Ecol* 2018; 43 (1): 59-62.
- European Scientific Counsel Companion Animal Parasites. ESCCAP Guideline 03 Sixth Edition. 2018 [cited 2020 Mar 23]. Available from: <https://www.esccap.org/guidelines/>
- Final report. A study to determine the efficacy of a single application of a flea treatment (imidacloprid/Permethrin Spot-on solution) when compared to an untreated control group against artificially induced infestations of fleas (*Ctenocephalides felis*) on dogs. Data on file. Krka, d. d., Novo mesto, Slovenia, 2014.
- Final report. A dose confirmation efficacy study of a single application of an imidacloprid/permethrin spot-on formulation against induced infestations of *I. ricinus* ticks on dogs. Data on file. Krka, d. d., Novo mesto, Slovenia, 2014.
- Final report. A dose confirmation efficacy study of a single application of an imidacloprid/permethrin spot-on formulation against induced infestations of *R. sanguineus* and *D. reticulatus* ticks on dogs. Data on file. Krka, d. d., Novo mesto, Slovenia, 2014.
- Pfister K, Armstrong R. Systemically and cutaneously distributed ectoparasitocides: a review of the efficacy against ticks and fleas on dogs. *Parasit Vectors* 2016; 9 (1): 436.
- Grist C: Pet owners more likely to find ticks on themselves [internet]. London: Reuters; 2008-2020 [cited 2020 Feb 3]. Available from: <https://www.reuters.com/article/us-health-pets-ticks/pet-owners-more-likely-to-find-ticks-on-themselves-idUSKBN19S28W>



KRKA-FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska, Telefon 01/ 63 12 101, E-mail: info.hr@krka.biz, www.krka-farma.hr

Pinar Design_05/2022, Hrvatska, HR-AH-2022-1

ATAXXA ODBIJA

krpelje, papatače i komarce i UBIJA buhe!



Ataxxa®

permetrin /imidakloprid
otopina za
aktivne pse



NE PRIMJENJIVATI NA MAČKAMA



Uživajte u zajedničkim avanturama!




Prije primjene pažljivo pročitajte uputu o VMP! O rizicima i nuspojavama posavjetujte se s veterinarom.



Psi su vrlo osjetljivi na ugrize krpelja i bolesti koje prenose.


Glavna sezona krpelja je od **ranog proljeća do kasne jeseni**.¹ Ako su zime blage, krpelji su aktivni tijekom **cijele godine**.² Krpelji mogu prenijeti **više od 14 različitih** opasnih bolesti na naše pse.³



Najveća aktivnost najčešćih europskih vrsta krpelja (*Ixodes ricinus*)

Krpelji se najčešće nalaze na glavi psa.

Mogu biti prisutni po cijelom tijelu, ali preferiraju područja bez dlaka i gdje je tanja koža.³



Mjesta ugriza krpelja na psima

Ataxxa® : tvoj prvi izbor za zaštitu od krpelja



- **Učinkovitost dokazana** u kliničkim studijama^{4,5,6}
- Djeluje **kontaktno**: učinak 'žarenja nožica' **sprječava krpelja da se hrani krvlju**⁷
- **Brzo djelovanje** permetrina⁷
- Zaštita od **3 najčešće vrste krpelja** u Europi



Kućni ljubimci mogu **unijeti krpelja** u naš dom. Vlasnici pasa imaju **dvostruko veće izgled** da će i sami pronaći krpelja na sebi.⁸



Kako zaštititi svog psa i obitelj od krpelja?

- Izbjegavajte **šumovita i grmovita** područja **s visokom travom**.
- Koristite **sredstva** za odbijanje krpelja.
- Nanesite svom ljubimcu Ataxxu **svaka 4 tjedna**.
- Pregledajte sebe i ljubimca **nakon svake šetnje**.
- Pažljivo **uklonite** sve krpelje.

Ataxxa® brzo rješenje kod pojave buha











- Djeluje na buhe **direktnim kontaktom** (buhe ne moraju ugristi da bi uginule).
- **Djeluje brzo** protiv odraslih buha.
- **Ubija ne samo odrasle buhe** nego i **ličinke** u životnom okruženju vašeg ljubimca.

Kako zaustaviti pojavu buha?

Napasti buhe u sve četiri faze životnog ciklusa tijekom **najmanje 3 mjeseca**:

- Nanesite Ataxxu vašem ljubimcu **svaka 4 tjedna**.
- **Redovito usisavajte** svoj dom (osobito tepihe i tapacirani namještaj) automobil
- **Perite** posteljinu i ručnike, svakih nekoliko dana (ako je moguće, najmanje 10 minuta na 60°C).

MAGIČNI TRIKOVI ZA USPJEŠNU ZAŠTITU OD PARAZITA

-  1. Pregledajte vašeg ljubimca nakon svake šetnje.
-  2. Prije primjene proizvoda potrebno je odrediti težinu psa.
-  3. Koristite pravu pipetu prema tjelesnoj težini vašeg psa.
-  4. Pročitajte uputu o proizvodu prije kupanja vašeg psa.
-  5. Nagradite vašeg ljubimca prije spavanja.
-  6. Otvorite vrećicu i izvadite pipetu prije primjene.
-  7. Odvojite vrh čepa od pipete.
-  8. Pričekajte da se vaš ljubimac opusti i stane mirno.